




ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ




ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๙๖ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การเทียบปริมาตรยาน้ำระหว่างช้อนชา - ซีซี (มิลลิลิตร)



1 ช้อนโต๊ะ
หรือ
15 ซีซี (มิลลิลิตร)

=
เท่ากับ



เอกสารอ้างอิง

1. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. คู่มือยาประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลักษณ์นิทานภัณฑ์; 2559

ผู้จัดทำบทความ: ภญ.ชนลวรรณ ผลประเสริฐ E-mail: vck_rx@hotmail.com






ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๙๗ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



ข้อควรรู้ เมื่อใช้กล่องแบ่งยา

ในปัจจุบันนี้มีกล่องแบ่งยาที่มีรูปร่างแปลกตา สีล้นสวยงาม แต่การใช้กล่องแบ่งยาอาจไม่สามารถรักษาสภาพของยาตามปกติไว้ได้ เพราะกล่องแบ่งยาที่มีขายทั่วไปนั้น มักไม่สามารถกันความร้อน ความชื้น และแสงแดดได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้กล่องแบ่งยาเพื่อความสะดวกในการรับประทานยา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1.

- ให้เลือกภาชนะที่สามารถปิดได้สนิท ป้องกันแสงและความชื้น




2.

- ไม่ควรแกะเม็ดยาออกจากแผง โดยให้ตัดแบ่งแผงยาตามปริมาณที่ต้องการ ระวังไม่ให้เกิดการฉีกขาดหรือมีรูรั่วของแผงยา



3.

- ไม่ควรตัดแบ่งเม็ดยาเพื่อทานเกิน 1 วัน



4.

- สังเกตลักษณะทางกายภาพของยาก่อนทานว่ามีสี กลิ่นหรือสภาพที่แตกต่างไปจากปกติหรือไม่ หากมีควรรับประทานยาดังกล่าว และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร



เอกสารอ้างอิง

๑. ใช้กล่องแบ่งยา เสี่ยงยาเสื่อมคุณภาพ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, แหล่งสืบค้น <https://oryor.com/oryorb6๐๑๕/print-detail.php?cat=๔๔&id=๑๓๓๕>

วันที่สืบค้น ๑๔ ก.ย. ๖๐

ผู้ต้นบทความ : ญญลักษณ์ ชินพวงสนน

E-mail : vck-ix@hotmail.com

