

แนวทางดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล และชุมชน

๑. ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองให้
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ นานๆ บ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่”

๒. ตรวจสอบสุขภาพเด็กประจำวันและบันทึกทุกวัน

๓. หากพบผู้ป่วยในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

๔. มาตรการป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้น ดังนี้



เมื่อเด็กป่วย ปฏิบัติดังนี้

- ❖ จัดให้นอนในห้องแยก หรือใช้ผ้า màn/ฉากกั้นเป็นสัดส่วนจากเด็กปกติอย่างน้อย ๑ เมตร
- ❖ ให้สารน้ำเกลือแร่(ORS)ทดแทน
- ❖ แยกของเล่น ของใช้ต่างๆ จากเด็กปกติ
- ❖ แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านและควรให้หยุดเรียนเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
- ❖ หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น กระหายน้ำมาก อ่อนเพลีย อาเจียน ถ่ายเป็นจำนวนมาก / เป็นมูกปนเลือด ควรส่งแพทย์ทันที

ทำลายเชื้อ ปฏิบัติดังนี้

- ❖ การทำความสะอาดอุปกรณ์และสิ่งของ สถานที่ รวมทั้งเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้)
- ❖ ขยะติดเชื้อ ให้รวบรวมใส่ถุงขยะ มัดปากถุง รอรถขยะเก็บกำจัดหรือเผาทำลาย
- ❖ การกำจัดเชื้อใช้น้ำยาซักผ้าขาว เช่น ไฮเตอร์ ½ ฝา ผสมน้ำ ๖๐๐ ซีซี แชทิ้งไว้ ๓๐ นาที ควรแยกทำความสะอาดผ้าปูที่นอนกับเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
- ❖ ห้องน้ำ ให้ใช้น้ำล้างห้องน้ำที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ ทำความสะอาดต่อเนื่อง ๓ วัน หลังผู้ป่วยหยุดถ่ายเน้นการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ
- ❖ ความเข้มข้นของน้ำยาทำลายเชื้อ ควรมีความเข้มข้นตั้งแต่
 - ๒๐๐ PPM สำหรับสิ่งของที่เด็กเอาเข้าปากได้
 - ๑๐๐๐ PPM สำหรับพื้น ชิงค์น้ำ โถส้วม
 - ๕๐๐๐ PPM สำหรับพื้นไม้

การดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด ปฏิบัติดังนี้

- ❖ เน้นมาตรการทำลายเชื้อที่ถูกต้องและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก
- ❖ ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ดำเนินการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคในบ้านเด็กป่วยและสอบสวนโรคในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
- ❖ ติดตามผู้ป่วยและสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าการระบาดของโรคจะสงบ



กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๘๘๗, ๐ ๒๐๓๒ ๘๘๘
โทรสาร ๐ ๒๐๓๒ ๘๘๙

