



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๒๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัตรแพ้ยา สำคัญอย่างไร??

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ผู้ป่วยควรต้องคำนึงถึงกันคือ การแพ้ยา ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายมีการตอบสนองต่อยา เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล โดยความรุนแรงของอาการแพ้ยาในแต่ละบุคคลจะมากน้อยต่างกัน เช่น ผื่นคัน ลมพิษ หน้าบวม ตัวบวม ผิวน้ำลอกไหม้ หายใจไม่ออก หรืออาจอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้นหากมีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นหลังจากได้รับยาให้หยุดกินยา ถ้ามีอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันที พร้อมนำตัวอย่างยาดังกล่าวไปด้วย และเมื่อได้รับการประเมินแพ้ยาโดยแพทย์หรือเภสัชกรแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับ บัตรแพ้ยา/เตือนเรื่องยา ประจำตัวผู้ป่วย



บัตรแพ้ยา/เตือนเรื่องยา

โปรดแสดงบัตรนี้ทุกครั้งเมื่อรับบริการตรวจรักษาหรือรับยา

เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้รับยาที่อาจเกิดอาการแพ้ตามีระบุไว้หรือไม่

ชื่อ-สกุล..... เบอร์ติดต่อ.....

HN.....

ที่อยู่.....

ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานพยาบาล.....

แพ้ยาอะไรบ้าง หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าแพ้ตัวใด

ให้หยุดยารับทันที และนำตัวอย่างยาดังกล่าวพร้อมซองยา (ถ้ามี)

ไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

บัตรแพ้ยา/เตือนเรื่องยา จะระบุข้อมูลดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล
- ผลการประเมินการแพ้ยา
- ข้อมูลผู้ป่วย เช่น ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
- หน่วยงานที่ออกบัตรแพ้ยา
- ชื่อยาที่แพ้
- ข้อควรปฏิบัติ
- อาการไม่พึงประสงค์

คำแนะนำในการใช้บัตรแพ้ยา

1. ผู้ป่วยที่แพ้ยาควรจดจำชื่อยาที่ท่านเคยแพ้
2. แสดงบัตรแพ้ยาทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์แก่แพทย์ผู้รักษา หรือเภสัชกร
3. เมื่อมีความจำเป็นต้องซื้อยารับประทานเอง ให้แสดงบัตรแพ้ยาแก่เภสัชกรประจำร้านยาทุกครั้งก่อนซื้อยา
4. บัตรแพ้ยานี้มีประโยชน์ในการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ โดยการหลีกเลี่ยงยา กลุ่มยา ที่เคยแพ้หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์
5. ควรอ่านข้อควรปฏิบัติในบัตรแพ้ยา หากมีข้อสงสัยสอบถามเภสัชกร
6. กรณีบัตรแพ้ยาหาย หรือชำรุด สามารถขอบัตรใหม่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

เอกสารอ้างอิง :

1. บัตรแพ้ยา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.kudbakhos.org/drug/2018/07/11/บัตรแพ้ยาสำคัญอย่างไร \(วันที่สืบค้นข้อมูล 28 มกราคม 2562\)](http://www.kudbakhos.org/drug/2018/07/11/บัตรแพ้ยาสำคัญอย่างไร (วันที่สืบค้นข้อมูล 28 มกราคม 2562)).
2. บัตรแพ้ยา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [https://www.honestdocs.co/what-is-it-allergy-card \(วันที่สืบค้นข้อมูล 28 มกราคม 2562\)](https://www.honestdocs.co/what-is-it-allergy-card (วันที่สืบค้นข้อมูล 28 มกราคม 2562)).

ผู้จัดทำบทความ : ภญ.อมลวรรณ ผลประเสริฐ E-mail : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้
ที่ QR CODE ด้านล่างนี้



กองเภสัชกรรม สำนักงานนาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๖ ม.๖ เขตห้วยขวางท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๘๘๐





ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๒๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง

เมื่อเด็กเล็กมีอาการไม่สบายและแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จะเป็น ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง หรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งต้องผสมน้ำก่อนใช้ ดังนั้นวิธีการผสมและการเก็บรักษายาปฏิชีวนะที่ผสมแล้วจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข้อปฏิบัติทั่วไปในการผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งแบบรับประทาน

1. เคาะขวดยาเพื่อให้ผงยาในขวดร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน
2. ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว หรือน้ำสะอาด (ห้ามใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน เนื่องจากอาจทำให้ยาบางชนิดเสื่อมสภาพได้) เติมน้ำลงในขวดประมาณครึ่งหนึ่งของขีดที่กำหนด หรือพอท่วมผงยา
3. ปิดฝาขวดยาให้ยากระจายตัว ไม่จับเป็นก้อนแข็ง
4. เติมน้ำให้ถึงขีดที่กำหนดไว้บนขวดยา แล้วเขย่าอีกครั้งเพื่อให้ยากระจายเข้ากันดี



คำแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งที่ผสมน้ำแล้ว

- เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
- ยาที่ผสมแล้ว สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นาน 7 วัน ถ้าเก็บในตู้เย็นจะสามารถเก็บได้นาน 2 สัปดาห์ ไม่เก็บไว้ในตู้เย็นช่องแข็ง สำหรับยาผงที่ยังไม่ได้ผสมน้ำ สามารถเก็บได้ตามวันหมดอายุที่อยู่บนฉลาก
- กรณีที่ได้รับยามากกว่า 1 ขวด ควรผสมทีละขวด รับประทานยาขวดแรกหมดก่อน แล้วจึงผสมยาขวดที่ 2
- ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะจนครบตามกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา

เอกสารอ้างอิง :

1.Chan GC, Tang SF. Parental knowledge, attitudes and antibiotic use for acute upper respiratory tract infection in children attending a primary healthcare clinic in Malaysia. Singapore Med J. 2006;47:266-70.

2.สุชาติดา ชุตินวาร์พันธ์, บรรณฉิการ. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม. กรุงเทพฯ, 2554.

ผู้ตั้งบทความ : ภญ.ชนิตา ชีระนันท์กุล E-mail : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้
ที่ QR CODE ด้านล่างค่ะ



กองเภสัชกรรม สำนักงานฯ กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๐๓, โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๘๓๐

